

## SE CONSIDERA QUE NO INDUCEN BACTERIEMIAS

- Procedimientos dentales que no provocan sangrado.
- Endoscopía con o sin biopsia gastrointestinal.
- Timpanostomía con colocación de diábolo.
- Caída de dientes de primera dentición.
- Inyección local de anestésicos.
- Cateterismo cardíaco.
- Fibrocolonoscopia.
- Sondaje vesical.

## RECUERDE

Si usted visita al urólogo o al ginecólogo y éste programa algún procedimiento es posible que le solicite un cultivo de orina y le administre antibióticos de acuerdo al resultado obtenido.

En estudios o procedimientos gastrointestinales debe avisar al infectólogo o cardiólogo para decidir si necesita profilaxis antibiótica antes de la realización de los mismos.

En el caso de necesitar drenajes o cirugías sobre tejidos infectados deberán recibir tratamiento antibiótico con derivados de penicilina o vancomicina o dirigidos al germen aislado.

**No se automedique ni tome decisiones sobre la profilaxis sin consultar con su médico de cabecera o cardiólogo.**



**FUNCACORR**  
FUNDACION CARDIOLOGICA CORRENTINA



INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES  
Juana Francisca Cabral

Bolívar 1334 | 3400 | Corrientes | 0379-4410000  
infectologia@funcacorr.org.ar  
pediatria@funcacorr.org.ar

Colaboración: Dr. Rafael Matías Comisario

[www.funcacorr.org.ar](http://www.funcacorr.org.ar)

Pequeño Manual para la

# Profilaxis de Endocarditis Infecciosa



### Estimado paciente:

*La enfermedad que usted presenta:*

.....  
*lo predispone a tener Endocarditis Infecciosa (infección de las válvulas y estructuras del corazón).*

*Para prevenirla, si su medico de cabecera o dentista necesita realizar procedimientos quirúrgicos o invasivos (que provocan sangrado) deben estar informados y discutir la necesidad de darle antibióticos o no antes de la realización de dichos procedimientos (profilaxis antibiótica).*

**Además, usted debe saber que ante cualquier episodio de fiebre debe consultar al medico, quien determinará la necesidad de tomar cultivos de sangre .**

Departamento de  
Cardiología Infantil

y Enfermedades Congénitas del Corazón



# ANTIBIÓTICOS

Usted deberá recibirlos antes de procedimientos dentales que precisan manipulación de la región gingival o periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral.

**No necesitan profilaxis el ajuste de prótesis, toma de radiografías, extracción de puntos, colocación o remoción de ortodoncias.**



**CUALQUIERA DE ESTOS ANTIBIÓTICOS, DEBEN SER ADMINISTRADOS 1 HORA ANTES DEL PROCEDIMIENTO Y NO NECESITAN DOSIS POSTERIOR.**

SITUACIÓN	ANTIBIÓTICO	VÍA/DOSIS ADULTOS	VÍA/DOSIS NIÑOS
No alérgicos a penicilina	Amoxicilina	Oral 2g.	50mg/kg
Alérgicos a penicilina	Clindamicina ó claritromicina	Oral 600mg. Oral 500mg.	20mg/kg 15mg/kg
Incapaces de recibir vía oral	Ampicilina	EV o IM 2g.	50mg/kg
Alérgicos a penicilina, incapaces de recibir vía oral	Clincamicina ó vancomicina	EV 600mg. EV 1g. (pasar en 1h)	20mg/kg 40mg/kg

# ESTIMADO PACIENTE

Si usted presenta alguna de las afecciones cardiológicas mencionadas abajo:

## A.- Cardiopatías congénitas

- Cianótica, sin cirugía de reparación o con defectos residuales, cortocircuitos o conductos paliativos.
- Con reparación completa con material protésico hasta 6 meses luego del procedimiento.
- Con persistencia del defecto residual.
- Defectos cardiacos congénitos cianóticos complejos.
- Shunts sistémico-pulmonares de origen quirúrgico.
- Ductus arterioso persistente.
- Defectos del tabique interventricular no corregidos.
- Válvula aórtica bicúspide.

## B.- Pacientes con válvulas protésicas u homoinjertos

## C.- Pacientes con endocarditis previa.

## DEBERÁ RECIBIR CUIDADOS ESPECIALES



**Mantenga cuidadosa salud bucodental.**

- Efectúe cepillado diario 2 veces por día, con cepillo blando, corto de cerdas parejas con pastas dentales que contengan flúor.
- Visite a su odontólogo cada 3 meses.
- Solicite a su odontólogo que le enseñe a cepillarse los dientes y usar palillos interdentes e hilo dental.
- Ocho horas antes de ir al odontólogo haga buches con clorhexidina.
- Controle frecuentemente con el dentista sus aparatos fijos o removibles de ortodoncia.

## Cuide su piel.

- Evite andar descalzo.
- No apriete barritos o puntos negros.

## Vacúnese.

- Todos los años en otoño aplíquese la vacuna antigripal y una vez en la vida la antineumocócica.

## Si tiene fiebre:

No se automedique, concurra al medico, quien indicara tomar cultivos de sangre, y si es transferido a este instituto, pida y traiga consigo los frascos de cultivo, para mayor análisis.

**Recuerde que el presente folleto debe ser mostrado a su medico o dentista antes de que se lo someta a cualquier procedimiento, ya sea diagnostico o terapéutico.**

