

¿Tiene algún riesgo el estudio?

Como cualquier estudio invasivo tiene sus riesgos y complicaciones, por ello solo debe realizarse con prescripción médica adecuada.

Complicaciones menores como sangrado a nivel del sitio de inserción del catéter ocurren en un 2% de los casos (2 de cada 100 pacientes).

Complicaciones más graves como infarto de miocardio (obstrucción de una arteria del corazón) o accidente cerebrovascular, son muy raras y pueden presentarse hasta en 1 de cada 500 pacientes (0,2%).

Otra complicación posible es la alergia al material de contraste la cual ocurre en 1 de cada 100 pacientes (1%).

Es importante que avise al equipo de salud todo antecedente de alergia.



¿Cómo consigo turno?

Debe traer el pedido médico autorizado por su obra social al **Servicio de Hemodinamia**, que se encuentra en el 2do Piso de la Institución, acompañado de un resumen de historia clínica firmado por el médico que solicita el estudio.

Más info

Teléfono:

3794 410000 internos 302 y 365

Mensaje de Whatsapp:

3795139238

Correo:


sec_hemodinamia@Funcacorr.org.ar

Su Turno

Fecha:

Hora:

Coronariografía y Angiografía periférica



Información para el paciente

¿Qué es una coronariografía o angiografía periférica?

Es un estudio diagnóstico que implica pasar un catéter (tubo fino) a través de una arteria en su pierna o muñeca directamente al corazón (coronariografía o cateterismo cardíaco) o a las arterias de sus piernas (angiografía periférica), para determinar si existen obstrucciones al flujo sanguíneo.

Para la realización de este estudio se utiliza un material denominado contraste, el cual contiene **Yodo** por lo que si usted tiene antecedentes de alergia al mismo, debe comunicarlo al servicio de enfermería que lo recibe antes del estudio.

Estará despierto durante el procedimiento. El área donde se inserta el catéter es adormecida con anestesia local.

La duración del procedimiento es variable entre 15 a 30 minutos, aunque en caso de dificultades durante el

¿Cómo debo prepararme?

Debe realizar un baño completo con agua y jabón la mañana previa al estudio, y venir acompañado por un familiar.

Traiga todos sus medicamentos actuales en sus envases originales y los estudios cardiovasculares mas recientes. Continúe tomando su medicación de manera habitual.

Si está tomando un anticoagulante como **ACENOCUMAROL** o **WARFARINA** se debe suspender dicha medicación 4 días antes del procedimiento.


En caso de recibir **RIVAROXABAN, DABIGATRAN** o **APIXABAN** debe suspender 2 días antes de lo contrario no podrá realizarse el procedimiento. Consulte con su medico si esta tomando uno de estos medicamentos para re-programar el estudio.

El procedimiento se llevará a cabo en una sala especial de Rayos X, con vestimenta estéril, por lo tanto debe ingresar solamente el paciente.

¿Voy a sentir dolor?

Puede sentir molestias durante la colocación del catéter en su muñeca o pierna.

Durante el estudio, al inyectar contraste en sus arterias puede sentir una **sensación de calor o adormecimiento leve y transitorio**.



Luego del procedimiento

Una vez que se haya extraído el catéter de la muñeca o la parte superior de la pierna, se aplicará presión para detener el sangrado y un vendaje compresivo el cual no debe retirar hasta pasadas 4-5 horas si es en la región de la pierna, o hasta 2 horas si fue en la muñeca.

Se le entregará un informe escrito del procedimiento el cual debe presentárselo al médico que solicitó el estudio.

