

HIGIENE

Ignaz Semme Iweiss dijo:

“ Por favor
lávese las manos.”

(Viena - 1847)



**Y mediante este sencillo acto
las infecciones se redujeron
en su servicio.**

COMITE DE CONTROL DE INFECCIONES
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES

1. PRECAUCIONES ESTÁNDARES

Para los fluidos corporales de los pacientes.



GUANTES DE EXÁMEN

Contacto con fluidos corporales, sangre, secreciones y excreciones.



LAVADO DE MANOS

Inmediatamente después de sacarse los guantes.
Todas las veces que estén sucias y antes y después de tocar un paciente.



CAMISOLÍN / DELANTAL

Para proteger de salpicaduras de fluidos corporales.



DESCARTADOR DE PUNZANTES

Descartar todo elemento corto/punzante inmediatamente después de su uso: agujas, bisturíes, mandriles de abbocat.



NO REENCAPUCHAR AGUJAS

Luego de retirado el capuchón, debe descartarse en su bolsa roja y la aguja en el descartador.



RESUCITADOR

Uso individual para cada paciente.



ROPA Y BASURA

Cumplir las normas de la Institución.



Bolívar 1334 | 3400 | Corrientes | Capital
Tel: 03783 41 00 00 Int. 206 | Fax: 03783 41 00 30
infectologia@funcacorr.org.ar
www.funcacorr.org.ar



Servicio de Infectología

Pequeño Manual para Prevención de Infecciones

1. Precauciones Estándares
2. Precauciones de Contacto
3. Precauciones de Contacto Respiratorio
4. Precauciones Respiratorias



Las normas básicas de control de infecciones se resumen en las PRECAUCIONES ESTÁNDAR.
El **lavado de manos** es la medida más barata y más eficaz para prevenir infecciones.

COMITE DE CONTROL DE INFECCIONES



INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES
Juana Francisca Cabral

2. PRECAUCIONES DE CONTACTO

Implementar precauciones de contacto además de las precauciones estándares.

• DESTINADAS A:

Pacientes colonizados o infectados con gérmenes multirresistentes, o infecciones entéricas.



HABITACIÓN PRIVADA

La puerta debe permanecer cerrada, puede compartir con otro paciente de igual patología.



ELEMENTOS EXCLUSIVOS

Elementos exclusivos para la atención del paciente o desinfectarlos luego del uso con alcohol 70%.



RESTRICCIÓN DE SALIDA

Evitar la salida del paciente con heridas abiertas. De lo contrario, colocarle barbijo y cubrir las heridas.



LAVADO DE MANOS

El uso de guantes no invalida el lavado de manos posterior.



CAMISOLÍN / DELANTAL

Para proteger de salpicaduras de fluidos corporales.



GUANTES

Colocarlos antes de ingresar a la habitación; retirarlos al salir de la habitación.

3. PRECAUCIONES DE CONTACTO RESPIRATORIO

Implementar precauciones de contacto respiratorio además de las precauciones estándares.

• DESTINADAS A:

Pacientes con neumonía, meningitis, sepsis, paperas, rubeola, parvovirus.



HABITACIÓN PRIVADA

La puerta debe permanecer cerrada, puede compartir con otro paciente de igual patología.



USO DEL BARBIJO

Colocarse barbijo cuando necesite estar a menos de un metro de distancia del paciente.



RESTRICCIÓN DE SALIDA

Evitar la salida del paciente. De lo contrario, colocarle barbijo.



LAVADO DE MANOS

El uso de guantes no invalida el lavado de manos posterior.



CAMISOLÍN / DELANTAL

Sólo para proteger de salpicaduras de fluidos corporales.



GUANTES

Colocarlos cuando va a tocar al paciente, removerlos luego de eso.

4. PRECAUCIONES RESPIRATORIAS

Implementar precauciones respiratorias además de las precauciones estándares.

• DESTINADAS A:

Pacientes con sospecha o confirmación de tuberculosis, varicela, sarampión.



HABITACIÓN PRIVADA

La puerta debe permanecer cerrada, puede compartir con otro paciente de igual patología.



USO DEL BARBIJO

Colocarse barbijo al ingresar a la habitación, retirarlo recién al salir de ella.



RESTRICCIÓN DE SALIDA

Evitar la salida del paciente. De lo contrario, colocarle barbijo.



LAVADO DE MANOS

El uso de guantes no invalida el lavado de manos posterior.



CAMISOLÍN / DELANTAL

Sólo para proteger de salpicaduras de fluidos corporales.



GUANTES

Colocarlos cuando va a tocar al paciente, removerlos luego de eso.